



sur l'extension et la contreextension pour la
réduction des fractures et luxations des os.

L'art de réduire les fractures et luxations des os n'a pas —
acquis le degré de perfection, dont il est susceptible, et l'on n'est
pas d'accord sur les points les plus essentiels, tels que le lieu, où il faut
placer les forces extensives et contreextensives, et la situation qu'il
faut donner aux membres pendant et après la réduction. Je me
suis permis quelques réflexions sur les objets, je les soumetts au
jugement de l'Académie.

presque tous les auteurs prescrivent de faire les extensions et
contreextensions sur les fragmens des os fracturés. M. M. Chopart et
Desault restreignent le précepte et recommandent de ne placer les
forces extensives et contreextensives sur les fragmens, que lorsqu'en le
portant ainsi, les muscles sur lesquels les puissances agissent, ne passent
pas sur la fracture, et de les placer sur les os voisins dans les cas
contraires. pour déterminer le lieu où elles doivent être placées, nous
devons faire attention que les muscles qui entourent une fracture
sont les seules puissances qui par leur contraction et leur raccourcissement

s'opposent à sa réduction; que c'est en procurant leur allongement que l'extension et la contre-extension surmontent leur résistance, et que la facilité de la réduction est en raison de cet allongement. à la pose, il est évident que le lieu le plus propre à placer les forces extensives et contre-extensives sera celui où les forces ne faisant aucune compression sur les muscles qui entourent la fracture, produiront leur plus grand allongement, en permettant à toutes leurs parties d'y contribuer. La seule fracture de la mâchoire inférieure permet de faire les extensions et les contre-extensions sur les fragments de l'os fracturé, sans comprimer les muscles qui passent sur la fracture. au contraire dans toutes les fractures des membres, les forces extensives et contre-extensives placées sur la partie blessée, compriment les muscles qui passent sur la fracture, et si la perversion est forte, la portion seule de ces muscles comprise entre les forces opposées, est allongée. il est certain que cette portion ne permet que très difficilement un allongement suffisant pour la réduction de la fracture, sans souffrir de déchirures et sans l'emploi de forces considérables. pour éviter la compression de ces muscles et pour favoriser l'allongement de toutes leurs parties par des forces très modérées, il faut placer les puissances extensives et contre-extensives au delà de leurs attaches. or dans tous les membres,

fracturés, il y a des muscles qui passent sur la fracture et ont leurs attaches au delà des fragmens de l'os fracturé; dans la fracture de la cuisse, par exemple, en quelqu'endroit qu'on suppose le fémur cassé, il y aura au moins les muscles droit antérieur, couturier, — droit interne, demi nerveux, demi membraneux, et la longue branche du biceps qui passeront sur la fracture et dont les attaches ne seront point sur les fragmens: dans celle de la jambe, les jumeaux et le plantaire; dans celle du bras, le biceps et la longue branche du triceps brachial; dans celle de l'avant-bras, le long supinateur, — les radiaux, les cubitaux et le long palmaire: donc dans toutes les fractures des membres, il faut placer les forces extensives et contr'extensives, au delà des fragmens, l'est adive, sur les os voisins.

Les auteurs du précepte de faire l'extension et la contr'extension sur les parties blessées, motivent leur opinion sur la perte de ces forces dans les articulations voisines, lorsqu'on les place au delà des fragmens. mais cette perte n'est qu'apparente. Les articulations sont fortifiées, non seulement par les ligamens, mais encore par tous les muscles qui les entourent. Les ligamens ne pourroient être tirés, et par conséquent une partie des forces se perdre dans les articulations, qu'autant que tous les muscles qui entourent les articulations seroient allongés, et que les fragmens seroient tirés ou retenus dans un sens



a les éloigner des os avec lesquels ils sont articulés, ce qui n'est point, comme il est facile de s'en assurer, en examinant, par exemple, ce qui se passe à l'articulation du genou, lorsque dans une fracture de la cuisse, les forces extensives sont placées à la partie inférieure de la jambe, en tirant cette partie, on tire tous les muscles qui attachés d'une part aux os de la jambe, ont leurs attaches supérieures au-dessus du genou. Ces muscles ainsi tirés entraînent les parties auxquelles ils tiennent si ces parties n'offrent pas une forte résistance, et au contraire ils s'allongent, si les parties auxquelles ils sont attachés résistent. Parmi les muscles qui entourent le genou, les uns s'attachent au fragment inférieur du fémur, et les autres au fragment supérieur, ou aux os du bassin. Le fragment supérieur et les os du bassin offrent une résistance insurmontable, non seulement à raison de leur masse et des parties avec lesquelles ils sont en connexion, mais encore à raison des forces contr'extensives: Les muscles qui les tirent et qui tendent à les entraîner, ne pouvant pas les déplacer, doivent s'allonger. Le fragment inférieur au contraire n'offre qu'une très petite résistance produite par l'action d'une portion des adducteurs de la cuisse; il remonte beaucoup, c'est par l'action des muscles Cruvel, vaste interne, vaste externe, droit antérieur, couturier, droit interne, demi-neveux, demi-membraneux et biceps, dont la contraction tire les os de la jambe en haut et fait remonter par contre-coup le fragment inférieur du fémur. Le fragment n'offrant que peu ou point

de résistance par lui même, sera tiré en bas par les muscles jumeaux plantaires et poplite, sans que les muscles souffrent aucun allongement par les forces extensives qui allongeront les précédens. il n'y aura donc point de perte de ces forces dans l'articulation du genou.

Si l'on convient que pour réduire les fractures, il faut faire les extensions et contr'extensions sur les os voisins de ceux qui sont fracturés, on sera forcé de convenir qu'il faut placer les membres fracturés dans l'extension, puisque deux puissances tirant en sens contraire un corps flexible, lui font nécessairement décrire une ligne droite. M. N. Chopart et DeFault, après avoir prescrit de placer les puissances extensives et contr'extensives sur les os voisins, lorsque les fragmens sont recouverts de muscles qui passent sur la fracture, ne pouvoient pas recommander de mettre le membre dans la demi flexion, ces deux choses étant incompatibles. M. Pott en prescrivant de faire l'extension et la contr'extension, le membre étant à demi fléchi, place les forces extensives et contr'extensives sur les fragmens de l'os fracturé. il est certain qu'en les plaçant ainsi, la demi flexion est la situation la plus favorable, parce qu'en mettant les muscles dans le relâchement et rapprochant leurs attaches inférieures des supérieures, une plus grande portion de ces muscles est comprise entre les forces extensives et contr'extensives, et cette portion peut contribuer à un plus grand allongement, que lorsque

le membre est dans l'extension. il est cependant aisé de voir que dans cette méthode, les muscles qui passent sur la fracture étant comprimés, ne permettent pas un allongement aussi considérable et aussi facile que lors qu'ils ne le sont pas, et que par conséquent la situation du membre ~~de~~ la position des forces dans laquelle ils sont garantis de toute compression, sont les plus avantageuses et préférables.

il n'en est pas de même après la réduction: il convient alors de situer les membres dans la demi flexion, excepté dans quelques fractures particulières. la cuisse et la jambe à demi fléchies peuvent être appuyées sur leur face postérieure ou sur l'externe. on les a situées sur la postérieure, jusqu'à nos jours; M. pott est le premier qui les a appuyées sur l'externe. Lorsque la cuisse est fracturée en travers, j'adopte la situation de M. pott, en employant comme

M. Deault quatre atelles et quatre coursinets de paille d'avoine. Lorsque c'est la jambe, M. pott donne de fort bons soins pour la placer aussi sur la face externe, savoir l'amaigrissement de la jambe, les douleurs et l'ulcération du talon, effets de la situation sur la face postérieure. j'ai vu une fois l'amaigrissement, je l'attribuai au bandage roulé dont je m'étais servi et auquel je renoncrai depuis — lors, pour les fractures même les plus simples. on prévient les douleurs et l'ulcération du talon, en ayant soin que le tendon d'achille soit porteur dans toute sa longueur, et que le talon ne soit point appuyé. la position sur le côté a aussi ses inconvénients: on ne peut garantir la

malléole externe d'une pression qui pourroit avoir des suites
fâcheuses, qu'en plaçant quelques lousfinet, ou si l'on se sert, comme
M. Default, d'un long lousfinet de paille d'avoine, en faisant qu'il
y ait une certaine quantité de paille de plus, au dessus de la
malléole et le long du bord externe du pied. Cette paille ou le
lousfinet placé au dessus de la malléole, presse le péroné, en pousse
les fragmens vers le tibia et leur consolidation se fait dans
une position vicieuse; le bord externe du pied est exposé à
quelques douleurs par une pression inévitable. Dans la position
au contraire de la jambe sur sa face postérieure, les muscles
sont poussés entre les deux os, les écartent et leur servent
d'attelles. malgré les avantages de cette position, la
situation sur le côté est préférable dans la plupart des cas,
à raison du plus grand soulagement des malades.



Lorsque les deux jambes ou les deux cuisses sont fracturées,
elles ne peuvent être situées que sur leur face postérieure.

Des extensions et contr'extensions permanentes me paroissent
préférables à la méthode de M. Foubert, pour la fracture du
col du fémur, et exigent la position de la cuisse sur sa face

postérieure. je les crois aussi nécessaires, ou pour le moins très utiles, pour la fracture oblique du corps du même os. pour les rendre supportables, j'ai fait construire un gesso-corne très simple, qui réunit les avantages de ceux de M. N. Nestrud et pieropan. il est composé d'un arc-boutant fait de deux pièces, dont l'une beaucoup plus longue que toute l'extrémité inférieure, a trois travers de doigt de largeur et un pouce d'épaisseur, l'autre de la même largeur et épaisseur, n'a que six pouces de longueur et est percée dans son milieu d'un trou de six lignes de diamètre. les deux pièces sont jointes à angle droit, par une de leurs extrémités, et leur union est fortifiée par un morceau de bois formant un triangle rectangle. l'autre extrémité de la longue pièce est surmontée d'une bride de fer et porte deux petits crochets ou boutons, à sa face externe, à deux pouces au-dessous de la bride.

voici comme j'en fais pour la fracture oblique du corps du fémur. je mets autour du corps, comme M. Nestrud, une ceinture de cuir souple, entourée de laine, recouverte de peau de chamois, portant un sous-vêtement que je fais passer à laine du côté sain, et ayant extérieurement du côté de la fracture, une courroie courue de manière que son extrémité libre, percée de deux rangées de trous, monte vers la région lombaire. je chauffe le pied, comme M. pieropan, d'un brodequin, qui monte au-dessus des malléoles,

laide sur le devant, et dont la femelle est percée d'un trou qui laisse passer une vis, dont l'extrémité quarrée est terminée par une tête aplatie, semblable à celle d'un clou, et ne peut tourner, parce qu'elle passe dans un trou quarré d'une plaque de fer courue autour de la femelle.

La ceinture et le brodequin garni de la vis, étant mis en place, je fais entrer la vis dans le trou de la pièce transversale de l'arc boutant; je passe la courroie qui tient au côté externe de la ceinture, sous la bride de la pièce longitudinale, et je la fixe aux deux petits crochets. je place un coussinet entre l'extrémité supérieure de l'arc boutant et la hanche. je passe un écou à deux branches autour de la vis. en tournant l'écou, la femelle du brodequin et par conséquent le pied, approchent de la traverse de l'arc boutant, qui pressée par l'écou fait force sur la pièce longitudinale, dont l'extrémité supérieure poussée en haut est retenue par la courroie, la courroie par la ceinture et celle-ci par le sous-cuisse. on voit que par cette manœuvre, la vis avançant dans l'écou fait des extensions graduées et l'extrémité supérieure de l'arc boutant une contre extension égale à l'extension. on tourne l'écou jusqu'à ce que l'extension soit suffisante, ce qu'on connoît par la confrontation des deux membres.

La réduction faite, j'entoure la cuisse de plusieurs morceaux de bande, comme M. N. pott et Default; je garnis mollement avec des coussinets ou de

L'étoupe fine les vides qui sont entre l'arcboutant et la partie externe de la cuisse. j'enveloppe la cuisse, la jambe et la longue branche de l'arcboutant d'un ou de deux lambeaux de linge fendus a leurs extrémités, pour former plusieurs chefs que je noue sur la face externe de l'arcboutant. je place toute l'extrémité sur des oreillers, si elle n'y a pas été placée avant l'opération, le pied plus élevé que le genou. je place le talon dans une talonnière dont les parties rependantes au tendon d'achille forment une gouttière qui le soutient dans toute sa longueur.

par ce procédé on réduit et on maintient réduite avec la plus grande facilité, la fracture oblique de la cuisse, sans fatigues plusieurs aides, et sans faire souffrir le blessé. L'appareil est très peu embarrassant et donne au malade beaucoup d'aisance pour satisfaire ses besoins. la pression du brodequin étant partagée sur une plus grande étendue, est moins fâcheuse que celle de tout autre linge.

si la fracture étoit au col du fémur, j'opérerois de même, et je n'appliquerois d'autre appareil que la talonnière et le lambeau de linge destiné à envelopper la cuisse, la jambe et l'arcboutant, ayant attention que le cours finet placé sur la

branche fut mis de manière à empêcher le grand trochanter de remonter. si dans la suite le fémur se guérit, quoique bien garni, meublé de laine, on pourroit le passer a celle du côté de la fracture, dans le cas de la fracture au corps du fémur, mais si elle étoit au col, il vaudroit mieux placer une bequille sous l'aisselle et la fixer a l'arcboutant. en variant ainsi de temps en temps le lieu de la contre extension, on la rendroit plus supportable. on pourroit aussi varier l'extension en plaçant une jarretière faite d'une large courroie recouverte de

laine et de peau de chamois, aux parties latérales de laquelle on fixeroit
deux anneaux qui serviroient à passer un lien qu'on appliqueroit à la ~~traverse~~
traverse de l'asc. boutant.



on n'est pas plus d'accord sur le lieu où il faut placer les forces extensives
et contr'extensives, et sur la situation qu'on doit donner aux membres, pour la
réduction des luxations, que pour celle des fractures. presque tous les auteurs
préservent de les placer sur les os luxés. M. M. Chopart et De Saule n'adoptent ce
précepte que pour les luxations, ou en les plaçant sur les os luxés, on ne ~~comprime~~
comprime aucun des muscles qui passent sur la luxation. il en est des luxations
comme des fractures, il n'y a que celle de la mâchoire inférieure où l'on puisse
faire l'extension sur les luxés sans comprimer les muscles qui passent sur la
luxation. Les mêmes motifs qui nous ont déterminé à placer les forces extensives
et contr'extensives sur les os voisins des fractures et non sur les fragments, doivent
nous empêcher de les placer sur les os luxés - en les plaçant sur ces os, on comprime
des muscles qui passent sur la luxation et on les empêche de prêter à l'allongement
de toutes leurs parties, la portion seule de ces muscles comprise entre ces forces
opposées participe à l'allongement, et ne pouvant quelquefois s'y prêter
suffisamment, ils sont déchirés, ou ils s'opposent à la réduction.

Les raisons que nous avons données pour prouver que les forces extensives et
contr'extensives ne se perdoient point dans les articulations voisines des os
fracturés, ont la même valeur pour les luxations. Le lieu où ces forces
doivent être placées, étant déterminé, il sera aisé de déterminer la situation
qu'on doit donner au membre. L'extension est la seule position que l'on puisse

Donner aux articulations voisines de celle ou est la luxation, par la raison que nous
avons exposé au ~~premier~~ sujet des fractures, savoir que deux puissances tirant
en sens contraire un corps flexible, lui font nécessairement décrire une ligne droite.
quant à l'articulation qui est le siège de la luxation, on doit la situer de manière
à relâcher les muscles tendus et à tendre ceux qui sont relâchés, afin de les mettre
tous dans une égale tension, ce qui exige de donner des directions différentes dans
les différentes luxations, et de changer la situation du membre à mesure que la
tension de certains muscles diminue et que celle de quelques autres augmente.
mais cette différence de situation n'a lieu que pour l'articulation ou est la
luxation, les articulations voisines doivent être toujours dans l'extension, il n'est
point étonnant que M. pott donne un précepte contraire, parce qu'il place les
forces extensives sur les luxés, et en les plaçant ainsi, la demi-flexion est plus
avantageuse que l'extension. si l'on fait attention à la facilité avec laquelle
on réduit le bras et la cuisse luxés, en faisant l'extension d'après les principes de
M. M. Dupuy et Fabre, sur le poignet et sur la partie inférieure de la jambe,
extension à laquelle une seule personne suffit, tandis que M. pott emploie trois ou
quatre personnes, pour faire l'extension sur le genou et sur le fémur, la jambe
étant fléchie, pour réduire la cuisse luxée, on conviendra des avantages qu'il y a
de ne point placer les forces sur les muscles qui passent sur la luxation, et de la
nécessité de mettre les articulations voisines dans l'extension. c'est dans les luxations
de la cuisse en bas, soit en dedans, soit en dehors, que les avantages de l'extension
de la jambe se manifestent. c'est cette extension qui en rend la réduction si facile
et si prompte dans la méthode de M. Dupuy. dans les deux luxations la tête du
fémur étant placée plus bas que la cavité cotyloïde, d'où elle est sortie, des
extensions qui tendroient à l'en éloigner d'avantage ne pourroient être que

nuisibles, or des extensions faites sur le fémur et sur le genou, la jambe étant adu-
fléchie, éloigneroient davantage la tête du fémur de la cavité; donc ces extensions
seroient préjudiciables. il faut employer des forces qui fassent remonter la tête du
fémur et qui la mettent à niveau de la cavité qu'elle a quittée, c'est ce que procure
la pression sur le genou, en opérant l'extension de la jambe. Lorsque la tête du
fémur est placée dans le trou ovalaire ou sur la tubérosité de l'ischium, la cuisse
étant plus longue que dans l'état naturel, les muscles couturiers, grêle interne, —
demi nerveux, demi membraneux, et la longue branche de biceps, qui ont leur
attaches supérieures aux os innominés, et les inférieures aux os de la jambe, doivent
nécessairement fléchir la jambe, pour éviter d'être allongés au delà de leur longueur
naturelle: le grêle antérieur qui a aussi ses attaches au bas fin et aux os de la
jambe et qui est antagoniste des muscles précédents, ne pouvant contrebalancer
leur action, se trouve nécessairement allongé; il fléchiroit la cuisse, si elle
n'étoit pas étendue par les muscles fessiers qui sont dans un état de tension.
Si une force supérieure à l'action des muscles fléchisseurs de la jambe presse sur
le genou, et oblige la jambe à s'étendre, il faut que la cuisse se raccourcisse en
surmontant les obstacles qui retiennent la tête du fémur, ou que les muscles
s'allongent au delà de leur longueur naturelle, ou qu'ils se déchirent. or —
les seuls obstacles qui s'opposent au raccourcissement de la cuisse, en —
empêchant la tête du fémur de remonter à niveau de la cavité cotyloïde,
sont le rebord du trou ovalaire dans la luxation en bas et en dedans, et la
dépression qui se trouve entre la tubérosité de l'ischium et le rebord inférieur et
externe de la cavité cotyloïde, dans la luxation en bas et en dehors. ces obstacles
ne sont pas assez considérables pour équivaloir à l'action des muscles —

fléchisseurs de la jambe, dont nous avons fait l'énumération, et les —
obliger à s'allonger extraordinairement, ou à se déchirer, si on étend —
la jambe, puis que dans la luxation en bas et en dedans, qui est la plus —
fréquente, le muscle obturateur externe tend à repousser la tête du fémur,
surtout si la luxation est récente et si l'on fait faire le mouvement de —
demi rotation de devant en dedans, et dans la luxation en bas et en dehors, —
la tête du fémur remonte ordinairement et la luxation s'échange en —
luxation en haut et en dehors, sans employer aucune force extérieure,
ce qui n'arriveroit pas si la tête du fémur étoit retenue par un obstacle —
puissant. La pression sur le genou, en étendant la jambe, dégagera donc —
la tête du fémur, du trou ovalaire, dans la luxation en bas et en dedans, —
la déplacera de dessus la tubérosité de l'ischium, dans la luxation en bas et —
en dehors, et dans l'une et dans l'autre, la fera remonter à la hauteur de la —
cavité cotyloïde, et redonnera à la cuisse sa longueur naturelle: alors —
la tête du fémur entrera dans la cavité cotyloïde, par l'action de tous —
les muscles moteurs de la cuisse, qui tendent à se mettre dans une égale —
tension à laquelle rien ne s'oppose.

à Toulon le 14. 46. 1767.



Manne